

RAM-MS

#8, 23.aug 2019

34 pasienter randomisert i studien!

Pasienter blir randomisert til arm A (HSCT) eller arm B (Mavenclad, Lemtrada og Ocrevus*).

VI MINNER OM DE VIKTIGSTE KRITERIENE FOR DELTAKELSE :

- 1) ATTAKK UNDER PÅGÅENDE MS-BEHANDLING SISTE ÅR, BEHANDLET MED STEROIDER OG VERIFISERT PÅ MR.
- 2) MINST 1 KONTRASTLADENDE MR-LESJON ELLER MINST 3 NYE ELLER FORSTØRREDE T2-LESJONER.
- 3) ALDER 18-50 ÅR.
- 4) RRMS ETTER MCDONALD-KRITERIER.
- 5) EDSS 0 TIL 5,5.
- 6) ATTAKKET/ATTAKKENE MÅ HA OPPSTÅTT MINST 3 MÅNEDER ETTER OPPSTART MED IMMUNMODULERENDE MEDIKAMENT.

Pasienter som tidligere har mottatt behandling med Lemtrada, HSCT, Mavenclad, Rituximab eller Ocrevus kan ikke inkluderes.

**Ocrevus er ikke foreløpig ikke tilgjengelig som studiemedisin i Norge*

Geografisk pasientfordeling

Helse Nord:	7
Helse Midt:	4
Helse Vest:	15
Helse Sør-Øst:	8

