

RAM-MS

#9, 27-Sep-2019

**36 pasienter randomisert i studien,
og gratulerer til Danmark som har tatt inn sin første pasient!**

Pasienter blir randomisert til arm A (HSCT) eller arm B (Mavenclad, Lemtrada og Ocrevus*).

VI MINNER OM DE VIKTIGSTE KRITERIENE FOR DELTAKELSE :

- 1) ATAKK UNDER PÅGÅENDE MS-BEHANDLING SISTE ÅR, BEHANDLET MED STEROIDER OG VERIFISERT PÅ MR.
- 2) MINST 1 KONTRASTLADENDE MR-LESJON ELLER MINST 3 NYE ELLER FORSTØRREDE T2-LESJONER.
- 3) ALDER 18-50 ÅR.
- 4) RRMS ETTER MCDONALD-KRITERIER.
- 5) EDSS 0 TIL 5,5.
- 6) ATAKKET/ATAKKENE MÅ HA OPPSTÅTT MINST 3 MÅNEDER ETTER OPPSTART MED IMMUNMODULERENDE MEDIKAMENT.

Pasienter som tidligere har mottatt behandling med Lemtrada, HSCT, Mavenclad, Rituximab eller Ocrevus kan ikke inkluderes.

**Ocrevus er ikke foreløpig ikke tilgjengelig som studiemedisin i Norge*

Geografisk pasientfordeling

Helse Nord:	7
Helse Midt:	4
Helse Vest:	15
Helse Sør-Øst:	8
Rigshospitalet:	1

